

文章编号: 1003-8701(2002)02-0053-01

春早熟青椒栽培技术

王宪超

(山东省沂水县道托乡农业技术推广站, 山东 沂水 276400)

中图分类号: S641.3

文献标识码: B

春早熟栽培青椒, 可以采用拱圆形中小棚等形式进行, 具有较高的经济效益。

①选用优良品种: 采用的品种主要有中椒 5 号、甜杂 1 号、湘研 1 号、保加利亚椒、羊角黄和苏椒 5 号等。

②培育壮苗: 中小拱棚栽培青椒, 播种期为立春左右, 定植期为 4 月中旬, 采用电热温床播种育苗, 或在冬暖大棚中播种育苗, 阳畦或春用大棚中分苗。

③定植: 定植期, 小拱棚加草苫的在 3 月底或 4 月上旬, 不盖苫的在 4 月上、中旬。定植时要求棚内 10 cm 地温稳定在 10~12℃。定植时选晴朗天气, 辣椒行距 35 cm, 甜椒 50 cm, 株距 30 cm, 开穴栽植, 每穴双株, 栽植深度以秧苗土坨与畦面相平, 栽后浇足水, 覆土后立即盖严拱棚的塑料薄膜。

④管理: 定植后至缓苗前不通风, 棚温白天控制在 25~30℃, 夜间 16~18℃; 缓苗后再适当通风, 白天控制在 23~28℃, 夜间不低于 15℃。选晴天的中午揭开薄膜中耕 1~2 次, 追一次肥, 然后浇水, 促进茎叶生长。青椒开花时应控制浇水, 中耕 1~2 次。为防止落花, 用毛笔蘸取 10~15 mg/kg 的 2,4-D 溶液涂花柄或用 20~30 mg/kg 的番茄灵溶液喷花, 注意不能喷到叶片及茎尖上。

青椒坐果后进行一次大追肥, 按每公顷施氮、磷、钾复合肥 210~240 kg, 施肥后划锄, 使土肥混合后浇水。小拱棚内温度白天控制在 21~26℃, 夜间不低于 15℃, 随天气转暖, 白天应加强通风, 当白天气温稳定在 20℃以上时, 揭开拱棚薄膜, 让植株接受自然光照, 傍晚前再盖好。要注意防治蚜虫, 可结合喷药在药液中同时加 0.2% 的磷酸二氢钾或 0.3% 的尿素进行叶面追肥。

青椒对椒要适时早收, 以免坠秧, 以后的果实只要个头基本长足, 适期早收, 既节省营养, 又对茎叶生长和上部果实坐果有利。5 月上旬以后, 当最低气温稳定在 15℃以上时, 可撤除小拱棚薄膜。

在肥水管理上, 对椒采收后可再追一次肥, 以后每隔 5~6 d 浇一次水, 保持土壤湿润。进入夏季, 遇雨及时排水。结合拔草, 用麦秸将畦面覆盖一层, 厚度为 3~5 cm 为宜, 既保持土壤湿润, 又可以防止地温过高, 同时又抑制杂草生长。