收稿日期: 1003-8701(2015)02-0071-07

抗灰霉病解淀粉芽孢杆菌的发酵条件优化

王晓辉, 王贵鹏, 张庆芳, 窦少华, 迟乃玉*

(大连大学辽宁省海洋微生物工程技术研究中心, 辽宁 大连 116622)

摘要:【目的】研究灰霉病拮抗菌 K1 的发酵条件。【方法】以 OD₆₀₀ 值为指标采用响应面法对其发酵培养基、发酵条件进行优化。通过 Plackett-Burman 实验确定酵母膏、pH、接种量为其最显著的 3 个因素。经过 Box-Behnken 实验和响应面实验得到最优发酵条件。【结果】最优发酵培养基为: 淀粉 1%, 酵母膏 1.8%, 硫酸钾 1.5%。最优发酵条件: pH 6.8, 接种量为 2.8%, 温度 25℃, 转速 130 r/min, 装液量 100 mL/250 mL。【结论】K1 发酵 16 h 后的 OD₆₀₀ 值可达到 1.490, 远高于优化前 0.864, 明显提高了 K1 的生长速率。优化后发酵液抑菌直径为 49 mm, 高于优化前的 43 mm。

关键词: 响应面; 拮抗菌; 灰霉菌; 抑菌直径

中图分类号: Q936

文献标识码: A

DOI: 10.16423/j.cnki.1003-8701.2015.02.020

Optimization of Fermentation Conditions of an Anti-*Botrytis cinerea* *Bacillus amyloliquefaciens*

WANG Xiao-hui, WANG Gui-peng, ZHANG Qing-fang, DOU Shao-hua, CHI Nai-yu*

(Liaoning Center of Marine Microbial Engineering and Technology, Dalian University, Dalian 116622, China)

Abstract: [Objective] Research on the fermentation conditions to K1, the antagonistic bacteria inhibiting *Botrytis cinerea*. [Methods] Fermentation medium and fermentation conditions were optimized in OD₆₀₀ index using response surface methodology. By the Plackett-Burman experiment the most significant three factors were yeast extract, pH, inoculum. After Box-Behnken experiment and response surface methodology, the optimum fermentation was determined. [Results] The optimum fermentation medium was 1% starch, 1.8% yeast extract, 1.5% K₂SO₄. The optimal fermentation conditions were as follow: pH 6.8, inoculation amount 2.8%, temperature 25 °C, rotation speed 130 r/min, liquid volume of 100 mL/250 mL. [Conclusion] The OD₆₀₀ of K1 was 1.490 after 16 h fermentation. It was much higher than 0.864, the OD₆₀₀ before optimization. The grow rate of K1 was increased significantly. Inhibition zone diameter was 49 mm. It was higher than 43mm, the inhibition zone diameter before optimization.

Keywords: Response surface methodology; Antagonistic bacteria; *Botrytis cinerea*; Antibacterial diameter

番茄灰霉病 (*Botrytis cinerea*) 是由真菌灰葡萄孢菌侵染所致, 该霉菌菌丝粗大, 孢子密集, 农作物染病后, 病部呈现灰褐色^[1]。灰霉病是一种世界性的农业病害, 每年造成严重的经济损失。目前, 抗灰霉病药物主要是化学农药, 带来环境污染的同时, 随灰霉病菌抗药性的增加, 抑菌效果逐年下降^[2]。生物农药具有高效、低毒的特性, 且因生物农药往往是多种抑菌物质同时作用, 抑

菌效果好, 致病菌不产生抗药性, 因此引起了广泛的关注。目前关于灰霉病拮抗菌的研究主要有田间防治^[3-4], 发酵条件优化^[5-6], 拮抗菌株的定殖^[7-8], 拮抗菌代谢产物分析^[9]等。因灰霉菌菌丝可在 2℃ 的低温环境生长^[10], 且致病机理十分复杂, 病原菌可产生降解酶、真菌毒素等^[11]。破坏植物的超微结构, 并发生病理变化。而生防菌株可产生多种抑菌代谢产物抑制菌丝生长和孢子萌发^[12], 同时空间上发挥营养上的竞争作用^[13], 从而达到良好的抑菌效果。目前研究较多的木霉菌 (*Trichoderma spp.*) 是一种有效的拮抗真菌^[14-15], 对多种植物病原真菌都有防治作用。而研究较多的生防细菌主要有芽孢杆菌 (*Bacillus spp.*)、土壤放射杆菌

收稿日期: 2014-10-22

基金项目: 863 计划子课题 (2007AA011306)

作者简介: 王晓辉 (1981-), 女, 讲师, 博士, 研究方向: 海洋低温酶制剂。

通讯作者: 迟乃玉, 男, 教授, E-mail: Cny7566@126.com

(*Agrobacterium radiobacter*)、假单胞杆菌(*Pseudomonas spp.*)等^[16]。其中与枯草芽孢杆菌亲缘较近的解淀粉芽孢杆菌(*Bacillus amyloliquefacien*)得到广泛的重视。

实验室筛选得到的抗灰霉病解淀粉芽孢杆菌 K1 有较好的抑菌效果。利用 Plackett-Burman (PB) 法对菌株 K1 的发酵条件进行优化。将所选出的因素以响应面法建立数学模型,能有效地优化响应因子,提高发酵效率,为后续生产提供重要的实验依据,也为该菌株的进一步应用奠定基础。

1 材料与方 法

1.1 菌株及培养基

菌株:拮抗菌 K1 (*Bacillus amyloliquefacien*), 灰霉病菌(*Botrytis cinerea*)。

斜面保藏培养基:20 g 马铃薯;2 g 葡萄糖;100 mL 水;pH 自然。种子培养基:0.3 g 牛肉膏;1 g 蛋白胨;0.5 g NaCl;pH 7.0;100 mL 蒸馏水。初始发酵培养基:1 g 葡萄糖;1 g 蛋白胨;1 g NaCl;pH 7.0;100 mL 蒸馏水。

1.2 菌株的分子生物学鉴定

采用酚氯仿抽提法提取拮抗菌 K1 的 DNA。以 16 S rDNA 引物进行 PCR 扩增。Forward primer P₁ (5'-CAGAGTTTGATCCTGGT-3'); Reverse primer P₂ (5'-AGGAGGTGATCCAGCCGCA-3') 进行 PCR 扩增^[16]。扩增反应体系 Ex Taq (5U/μL) 0.25μL, Buffer 5.0μL, dNTP mixture 5.0μL, Forward primer 0.5μL, Reverse primer 0.5μL, 补加 ddH₂O 到 50 μL。扩增程序为:94℃预变性 5 min;94℃变性

1 min,55℃复性 1 min,72℃延伸 1.5 min,30 个循环;72℃延伸 5 min。PCR 产物测序,NCBI 进行 BLAST 比对,并以 MEGA5 软件进行系统发育树的构建。

1.3 单因素法优化

将斜面保藏的菌株 K1 活化后,接种于种子培养基中。以 1%(V/V)的接种量将对数期的种子培养基接种于 100 mL 的初始发酵培养基中,于 30℃,130 r/min 下摇床培养 16 h。从中取 3 mL 测 OD₆₀₀。以相同的未接种的发酵培养基调零。

通过单因素法分别确定最适碳源及碳源浓度,最适氮源及氮源浓度,最适无机盐及无机盐浓度。进而初步确定发酵培养基。

将菌株 K1 接种于初步确定的发酵培养基上,以单因素法优化温度、pH、转速、装液量、接种量。初步确定发酵条件。根据单因素实验结果选 6 个因素进行 PB 实验。

1.4 发酵条件的实验设计

1.4.1 发酵条件 Plackett-Burman (PB) 设计

以表 1 设计 Plackett-Burman (PB) 实验,以发酵液的 OD₆₀₀ 值作为指标,通过 Minitab 软件设计 6 因素两水平的 N=12 次的 Plackett-Burman 实验设计。并根据显著性分析结果,设计最陡爬坡实验。

1.4.2 中心组合实验设计

根据 Box-Behnken 中心组合设计原理和 PB 结果、最陡爬坡试验的结果确定 3 个重要因素,完成三因素,三水平的 N=15 的响应面实验设计。

表 1 Plackett-Burman (PB) 实验设计的因素和水平

	A	B	C	D	E	F
因素	淀粉 (%)	酵母膏 (%)	硫酸钾 (%)	温度 (°C)	pH	接种量 (%)
-1	1.0	1.0	1.0	25	5	1
+1	1.5	1.5	1.5	30	6	2

1.5 抑菌实验

用优化前后的发酵培养基做抑菌实验。用打孔器在 PDA 培养基中心打洞,将孢子悬液均匀涂布到培养基上,并将 0.1 mL 待测发酵液滴加到洞内,27℃培养 96 h,测其抑菌直径。抑菌直径=(最大直径+最小直径)/2。

2 结果与分析

2.1 菌株鉴定

实验室于土壤中筛选一株灰霉病拮抗菌 K1,对灰霉病有较强的抑菌效果。抑菌直径在 40mm 以上。经 16S rDNA 鉴定拮抗菌 K1 为解淀粉芽孢杆菌(*Bacillus amyloliquefacien*)。将其命名为 *Bacillus* K1。

2.2 单因素实验结果

通过单因素实验,得出最优发酵培养基为:淀粉 1%、酵母膏 1%、硫酸钾 1.5%。最优发酵条件:pH 6.0、接种量为 2%、温度 25℃、转速 130 r/min,装液量 100 mL/250 mL。

图1 菌株 K1 的 16S rDNA 进化树

图2 拮抗菌 K1 的最适碳源

图3 拮抗菌 K1 的最适氮源

图4 拮抗菌 K1 的最适无机盐

图5 拮抗菌K1的最适发酵条件

2.3 PB实验设计筛选显著性影响因素

在单因素实验基础上选择对发酵结果影响明

显的6个因素,进行N=12次的Plackett-Burman实

验设计。PB实验设计如表2,筛选出3个影响较

表2 Plackett-Burman(PB)实验设计与响应值表

代码	A	B	C	D	E	F	OD ₆₀₀
1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	1.391±0.029
2	-1	+1	+1	+1	-1	+1	1.402±0.032
3	+1	-1	+1	+1	-1	+1	1.381±0.023
4	+1	+1	+1	-1	+1	+1	1.451±0.017
5	-1	+1	+1	-1	+1	-1	1.423±0.022
6	-1	+1	-1	-1	-1	+1	1.427±0.028
7	+1	+1	-1	+1	+1	-1	1.437±0.017
8	-1	-1	-1	+1	+1	+1	1.415±0.034
9	-1	-1	+1	+1	+1	-1	1.359±0.058
10	+1	+1	-1	+1	-1	-1	1.374±0.026
11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.307±0.019
12	+1	-1	+1	-1	-1	-1	1.336±0.021

注:表中的数据为平均值±标准差

表3 Plackett-Burman实验设计的各因素水平及显著性分析

代码	因素	-1	+1	t值	Prob>t	显著性
A	淀粉(m/V)	1.0%	1.5%	0.60	0.576	4
B	酵母膏浓度(m/V)	1.0%	1.5%	5.25	0.003	1
C	K ₂ SO ₄ (m/V)	1.0%	1.5%	0.02	0.988	6
D	温度	25°C	30°C	0.53	0.617	5
E	pH	5	6	4.02	0.010	2
F	接种量(V/V)	1%	2%	3.73	0.014	3

大的因素。Minitab 显著性分析结果如表 3。

2.4 最陡爬坡实验

根据 Plackett-Burman 实验得出:酵母膏、pH、接种量为影响发酵的最显著的 3 个因素,根据

Minitab 设计最陡爬坡实验如表 4。寻找最大响应值及最佳因子组。酵母膏浓度为 1.7%(m/V), pH 为 6.5, 接种量为 2.5%(V/V)时为最佳因子组,以最佳因子组作 BB 实验的中心点。

表 4 最陡爬坡实验设计及实验结果

代码	酵母膏	pH	接种量	OD ₆₀₀
1	1.5	6.0	2.0%	1.280±0.040
2	1.7	6.5	2.5%	1.342±0.024
3	1.9	7.0	3.0%	1.151±0.012
4	2.1	7.5	3.5%	0.895±0.026

2.5 响应面实验设计

2.5.1 BB(Box-Behnken)中心组合实验设计

以最陡爬坡实验的结果为中心点,由 Plackett-Burman 实验确定的 3 个显著性因素进行 Box-Behnken 实验的中心组合设计。每个因素设置 3 个水平,即 N=15 组实验。如表 5,表 6。每组实验进行 3 次重复,结果取 3 次实验的平均值。

表 5 因素水平设计代码表

因素	-1	0	+1
X ₁ 酵母膏浓度(m/V)	1.5%	1.7%	1.9 %
X ₂ pH	6.0	6.5	7.0
X ₃ 接种量(V/V)	2.0%	2.5%	3.0%

2.5.2 二次回归拟合与方差分析

根据 Minitab 软件对试验结果分析得二次回归方程:

$$Y=1.4803+0.0096X_1+0.0169X_2+0.0135X_3-0.0160X_1^2-0.0235X_2^2-0.0098X_3^2+0.0168X_1X_2+0.0000X_1X_3+0.0010X_2X_3$$

回归方程中,响应值 Y 为拮抗菌发酵液的

OD₆₀₀ 值;变量 X₁ 为酵母膏, X₂ 为 pH, X₃ 为接种量。对方程进行方差分析(表 7)。

表 6 Box-Behnken 实验设计与结果

编号	X ₁	X ₂	X ₃	OD ₆₀₀
1	-	0	-	1.432±0.027
2	-	-	0	1.425±0.030
3	+	0	-	1.452±0.038
4	-	+	0	1.438±0.021
5	0	0	0	1.480±0.019
6	0	+	-	1.442±0.018
7	0	+	+	1.473±0.018
8	0	-	+	1.450±0.022
9	+	-	0	1.410±0.026
10	-	0	+	1.457±0.028
11	+	0	+	1.477±0.017
12	0	0	0	1.483±0.031
13	0	-	-	1.423±0.025
14	0	0	0	1.478±0.021
15	+	+	0	1.490±0.038

注:表中数据为 平均值±标准差

根据响应面方差分析结果,模型失拟项

表 7 回归方程的方差分析

方差来源	自由度	调节平方和	调节均方	F 值	P 值
回归	9	0.008 583	0.000 954	13.75	0.005
线性	3	0.004 477	0.001 492	21.51	0.003
方差	3	0.002 980	0.000 993	14.31	0.007
交互作用	3	0.001 126	0.000 375	5.41	0.050
剩余误差	5	0.000 347	0.000 069		
模型失拟	3	0.000 334	0.000 111	17.59	0.054
模型失拟	2	0.000 013	0.000 006		
总计	14	0.008 930			

(Lack of Fit):0.054,模型失拟项不显著,说明模型选择比较合适。回归系数 $R^2=96.12\%>90\%$,说明模型相关度很好。

2.5.3 响应面分析

根据响应面分析数据,绘出响应面及其等高线图,反映出酵母膏、pH、接种量之间的交互影

响。图6,图7,图8分别显示了以 OD_{600} 值为响应值的趋势图,等高线图可直观反应两变量间的交互影响。响应面分析最高的 OD_{600} 值为1.493。而优化前,K1在初始发酵培养基中发酵16 h后,所得发酵液的 OD_{600} 值仅为0.864。优化后菌株生长速率远高于优化前。

图6 酵母膏(X_1)与pH(X_2)交互影响的曲面图和等值线图

图7 酵母膏(X_1)与接种量(X_3)交互影响的曲面图和等值线图

图8 pH(X_2)与接种量(X_3)交互影响的曲面图和等值线图

2.6 优化前后抑菌效果

优化后的抑菌效果如图9B,抑菌直径达到

49 mm,远高于优化前的43 mm(图9A)。

图9 优化前后抑菌效果

注:A:优化前抑菌效果;B:优化后抑菌效果

3 结论与讨论

番茄灰霉菌菌丝粗大,孢子在较低温度下便可以萌发,使农作物染病,造成严重的经济损失。实验室于土壤中筛选出一株抗灰霉病拮抗菌,16S rDNA鉴定为解淀粉芽孢杆菌。解淀粉芽孢杆菌K1具有很强的抑菌效果。对灰霉病的抑菌直径40 mm以上。在以往的报道中,拮抗菌发酵条件的研究往往以抑菌圈直径作为指标。但在实验前期工作发现,条件优化各实验组之间抑菌直径相差不明显,故采用OD₆₀₀值为指标。

本实验利用 Box-Behnken 模型对解淀粉芽孢杆菌发酵条件进行优化,方差分析表明模型拟合度良好。得出最优发酵培养基为淀粉1%,酵母膏1.8%,硫酸钾1.5%。最优发酵条件pH6.8,接种量为2.8%,温度25℃,转速130 r/min,装液量100 mL/250 mL。通过响应面法对发酵条件进行优化,即提高菌株K1生长速率,又增强了抑菌效果,并建立解淀粉芽孢杆菌发酵条件的数学模型,对拮抗菌的防病研究有重要意义。为进一步扩大生产提供实验依据。

与枯草芽孢杆菌亲缘性较近的解淀粉芽孢杆菌(*Bacillus amyloliquefaciens*)抑菌广谱性强,对炭疽病(*Anthraxnose*)^[17]、灰霉病(*Botrytis cinerea*)^[18]、青霉病(*Penicillium italicum*)^[19]、梨轮纹病(*Physalospora piricola*)^[20]等都有抑制作用,早已得到广泛的重视。2010年邓建良分离得到的解淀粉芽孢杆菌YN-1对灰霉病等多种真菌病害都有抑制效果^[21]。全鑫等研究拮抗菌YB-81对灰霉菌抑制率达80.5%,且具有良好的广谱性^[22]。2009年,Sharma R等研究的解淀粉芽孢杆菌对蔬菜和水果有良好的抑菌效果,已经进行了半商业化的实验,有的拮抗菌已经制成商品投放市场^[23]。

参考文献:

[1] 韩斯琴,徐梅,白震,等.抗番茄灰霉病菌农用抗生素D2-4发酵条件的研究[J].沈阳农业大学学报,2003,34(4):259-262.

[2] 周明国.中国植物病害化学防治研究(第1卷)[M].北京:

中国农业科技出版社,1998:21-27.

- [3] 韦发才,田在山,杨再豪,等.葡萄灰霉病防治药剂试验[J].农药科学与管理,2005,26(10):23-24.
- [4] 沈建生,滕元文,王华新,等.施佳乐、扑海因、速克灵单用及混用防治葡萄灰霉病田间药效试验[J].中国南方果树,2005,34(6):66-67.
- [5] 黄明媛,顾文杰,张发宝,等.番茄青枯病筛选鉴定及其发酵条件初探[J].微生物通报,2011,38(2):214-220.
- [6] 孙长江,张建新,汪璇,等.响应面法优化黄粉虫抗菌肽酶解工艺[J].食品科学,2013,34(7):234-239.
- [7] 谷祖敏,王芳.拮抗细菌B9对灰霉菌的影响及在番茄叶表的定殖[J].云南农业大学学报,2006,21(6):842-844.
- [8] 郭继平,马光.内生拮抗菌株AC8在甘蓝体内的定殖及其促生效果[J].湖北农业科学,2012,51(10):2020-2022.
- [9] Lu XY, Li SZ, Ma P, et al. Isolation and partial purification of an extracellular metabolite from a *Bacillus subtilis* strain NCD-2 active against *Verticillium dahlia*[J]. Shandong Science, 2005, 18(3): 22-25.
- [10] 李风云,李宝聚,许淑艳.番茄灰霉病病原菌的生物学特性[J].辽宁农业科学,1992(4):34-36.
- [11] 郑晓莲,薛金阜,齐秋锁.灰葡萄孢毒素的组分分析和生物测定[J].植物病理学报,1998,28(3):269-274.
- [12] 钱兰娟,李倩,张清霞,等.生防细菌L5生防相关因子的初步分析及其种类鉴定[J].植物病理学报,2011,41(3):295-300.
- [13] 童蕴慧,纪兆林,徐敬友,等.灰葡萄孢拮抗细菌在番茄植物体表的定殖[J].中国生物防治,2003,19(2):78-81.
- [14] 戚洪泉,李雅华,郭立忠,等.木霉菌Td31菌株产生的拮抗物质性质研究[J].青岛农业大学学报,2008,25(4):294-297.
- [15] 赵亚玲,惠有为,赵健,等.低温木霉对灰霉的拮抗作用[J].应用化工,2010,39(9):1303-1308.
- [16] 程亮,游春平,肖爱萍.拮抗细菌的研究进展[J].江西农业大学学报,2003,25(5):732-737.
- [17] 罗萍,区建发,杨炜钊,等.香蕉炭疽菌拮抗生防菌株的筛选及鉴定[J].现代食品科技,2011,27(3):275-278.
- [18] 王奕文,胡文兵.许玲甜瓜果实表面生防芽孢杆菌的类群与鉴别[J].植物病理学报,2008,38(3):317-324.
- [19] Sun L J, Lu Z X, Bie X M, et al. Isolation and characterization of a co-producer of fengycins and surfactins, endophytic *Bacillus amyloliquefaciens* ES-2 from *Scutellaria baicalensis* Georgi [J]. World Journal of Microbiology Biotechnology, 2006(12): 1259-1266.
- [20] 罗萍.梨储藏期病害生防菌及防腐保鲜的研究[D].成都:四川农业大学,2009.
- [21] 邓建良,刘红彦,刘玉霞,等.解淀粉芽孢杆菌YN-1抑制植物病原真菌活性物质鉴定[J].植物病理学报,2010,40(2):202-209.
- [22] 全鑫,薛保国,杨丽荣,等.生防菌株YB-81的鉴定及其对番茄灰霉病的防效[J].植物保护,2010,36(5):57-60.
- [23] Sharma R R, Singh D, Singh R. Biological control of postharvest diseases of fruits and vegetables by microbial antagonists: A review[J]. Biological Control. 2009, 50(3): 205-221.