苹果梨 *MYB108* 基因的克隆与序列分析

孟义淳, 曲柏宏*, 王甜元, 白金月, 杜昱彤, 王 玥

(延边大学农学院, 吉林 延吉 133000)

摘要: MYB 家族是调节花青素合成最为关键的转录因子成员, 通过前期转录组测序发现, 影响花青素的 MYB 转录因子中 *MYB108* 基因在不同时期表达具有差异, 其对花青素生物合成调节作用未见报道。本研究成功克隆了 *MYB108* 基因, 鉴定其 ORF 为 891 bp, 含有 296 个氨基酸, 理论等电点 (pI) 为 6.30, 属不稳定蛋白, 具有 SANT/Myb 结构域, 鉴定是 MYB 转录因子家族基因。红皮梨色泽受到花青素含量的影响, 本研究意在为今后验证其基因与花青素之间的关系提供先决条件。

关键词: 苹果梨; *PbMYB108*; 克隆; 序列分析

中图分类号: S661.2

文献标识码: A

文章编号: 2096-5877(2020)02-0060-04

Cloning and Sequence Analysis of *MYB108* Gene from ‘Pingguoli’

MENG Yichun, QU Baihong*, WANG Tianyuan, BAI Jinyue, DU Yutong, WANG Yue

(College of Agriculture, Yanbian University, Yanji 133000, China)

Abstract: The MYB family is the most important member of transcription factors that regulate anthocyanins synthesis. Through early transcriptome sequencing, it was found that *MYB108* gene in the MYB transcription factors affecting anthocyanins had different expression in different periods, and its regulation effect on anthocyanin biosynthesis was not reported. The MYB gene was successfully cloned and identified as a *MYB108* transcription factor family gene with an ORF of 891 bp, pI of 6.30, containing 296 amino acids, and it's an unstable protein with a SANT/Myb domain. The color of red pear was affected by the anthocyanin content. The purpose of the study was to provide a prerequisite for further verification of the relationship between the gene and the anthocyanin.

Key words: ‘Pingguoli’; *PbMYB108*; Cloning; Sequence analysis

果实着色归因于花青素的积累, 其中 MYB 是调节花青素合成最为重要的转录因子之一, 许多 MYB 家族基因参与果实着色过程, 并且该类基因大多具有 DNA binding 结构域。红色砂梨去袋后, *PpMYB10* 与结构基因协同作用共同促进花青素的产生, 然而 *PpMYB1* 无此现象^[1]。同样对于‘奥冠’采用套袋与 MeJA 处理后, *PyMYBa* 和 *PyMYB10* 的含量波动与花青素含量波动趋势相类似^[2]。在‘早红考密斯’和‘早酥’梨上发现, *PcMYB10* 和 *PpMYB10* 的含量变化与花青素含量变化相关。且 *PpMYB10* 启动子甲基化水平高低会影响花青素的产量多少^[3-4]。有研究发现, II 型梨品种内 *MYB10* 表达水平与花青素积累水平呈现正相关性, 然而在 I 型或 III 型品种中花青素积累

量与 *MYB10* 的表达量不相关^[5]。*PbMYB9* 是花青素形成途径的调节剂, 为一种 TT2 型 MYB, 不仅可以通过激活 *PbANR* 启动子激活原花青素途径, 还可通过结合 *PbUFGT1* 启动子诱导花青素的产生。*PbMYB10b* 可以作为特异性调节剂促进 *PbDFR* 的表达, 诱导原花青素和花青素的生物合成^[6]。*MYB10* 和 *bHLH33* 的表达在西方梨中显著相关, 但是在东方梨中 *MYB10* 和 *bHLH33* 之间没有共表达^[7]。果实肉质颜色由于 *MYB10* 的表达量变化从而具有差异性, 其中红色肉果中 *MYB10* 表达量较高^[8]。将 *MdMYB10* 过表达会导致苹果果皮中花青素累积增加, 同样将 *MdMYB10* 沉默处理后, *MdMYB10* 的表达量及花青素累积显著下降, 同时各个结构基因的表达也有不同程度的降低, 进而造成果皮着色不明显^[9]。对‘澳洲青苹’解除果袋后, 果皮中 *MdMYB10*、*MdMYB1* 转录水平相比于未套袋中的转录水平显著提高, 表明其对澳洲青苹果实着色的关键作用^[10-11], 并且套袋情况下, *MdMYB10* 与 *MdMYB1* 的表达量明显减少^[12]。

收稿日期: 2019-06-28

基金项目: 国家自然科学基金(31160389)

作者简介: 孟义淳(1994-), 男, 在读硕士, 从事果树栽培与生理研究。

通讯作者: 曲柏宏, 男, 博士, 教授, E-mail: bhqu211@ybu.edu.cn

1 材料与方 法

1.1 材 料

将采收的成熟期的苹果梨削取果皮,立刻放入液氮内速冻后放入 -75°C 冰柜中储存。

1.2 试剂

Total RNA Kit (OMEGA)、Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche)、Ex Taq、Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0、pMD™18-T Vector Cloning Kit、*E. coli* DH5 α 、Competent Cells、X-gal、IPTG、Marker(DL2000)等购置于TaKaRa, TAE、EB、Amp、Tryptone、Yeast Extract等购置于索莱宝。

1.3 总 RNA 提取以及 cDNA 合成

取 100 mg 果皮,在液氮中迅速研磨后,利用 RNA 提取试剂盒回收其总 RNA,将获得的 RNA 利用反转录试剂盒进行反转录以形成 cDNA。

1.4 引物设计 及目的基因 PCR 扩增

依据转录组测序以及 NCBI 已登录的梨属 *MYB108* 基因,使用 NCBI 与 Oligo7 软件设计克隆 *MYB108* 基因的一对特异引物,引物序列如下:

F(5'-3'):ATGGCTGCTCCTAGAAACCCT

R(5'-3'):TCACATCCCGTCCATGTTCCA

PCR 扩增体系:25 μL ,其中 cDNA 模板 1 μL , dNTP 2 μL , MYB108F 1 μL , MYB108R 1 μL , Taq 酶 0.2 μL , 10 $\times$ ExTaqBuffer 2.5 μL , 无菌水 17.3 μL 。PCR 反应程序:94 $^{\circ}\text{C}$ 4 min;94 $^{\circ}\text{C}$ 30 s,57 $^{\circ}\text{C}$ 30 s,72 $^{\circ}\text{C}$ 1 min,(35 个循环);72 $^{\circ}\text{C}$ 7 min。

1.5 目的基因的回收及连接转化测序

MYB108 基因使用胶回收试剂盒纯化,然后与 PMD-18T 载体 10 μL 体系过夜连接,转化到感受态 DH5 α 细胞中,均匀涂抹在含有 Amp 的 LB 固体培养基上,于 37 $^{\circ}\text{C}$ 条件下,倒置培养 12~16 h,挑取单一菌落,浸入加有 Amp 的液体 LB 培养基中,37 $^{\circ}\text{C}$ 、190 r 培养 4 h,经菌液 PCR 验证成功后,邮给英维捷基公司测序。

2 结果与分析

2.1 苹果梨果皮总 RNA 提取

RNA 进行 1% 琼脂糖凝胶电泳(图 1),RNA 降解程度较低。利用核酸微量分光光度计检测提取出 RNA 的质量,OD 值为 1.86,在 1.8~2.1 之间,说明 RNA 纯度较高没有其他污染,且 RNA 浓度为 369 ng/ μL 。

2.2 目的基因的克隆

将提取的 RNA 进行反转录,以形成 cDNA,用于

图 1 总 RNA 检测图

PCR 扩增,并将扩增后的产物进行琼脂糖凝胶电泳检测,获得一条 1000 bp 附近条带。其参考 *MYB108* 编码区长度为 891 bp,推测扩增得到目的基因(图 2)。将 PCR 产物纯化,连接转化并进行菌液 PCR 检测,再送去测序。测序结果表明,目的基因全长序列为 891 bp,将基因编码区序列进行比对,确定成功克隆获得了 *MYB108* 基因,命名为 *PbMYB108*。

M:PCR Product 1:DL 2000Marker

图 2 *PbMYB108* 的 PCR 扩增电泳检测图

2.3 *PbMYB108* 序列分析

2.3.1 氨基酸序列与系统发育树构建

为了深入探究 *PbMYB108* 蛋白较与其他植物氨基酸之间的亲缘关系远近,运用 DANMAN 进行序列比对,并运用 MEGA 软件将 *PbMYB108* 蛋白与其他植物 MYB 蛋白构建发育树(图 3)。

对比氨基酸序列发现,*PbMYB108* 与白梨 MYB108 蛋白(XP_009356251.1)的一致性最高为 98.31%,与 MYB305 蛋白(XP_008389270.2)的一致性为 95.27%。

系统发育树显示(图 3):苹果梨 *PbMYB108* 蛋白与苹果属 MYB305 蛋白亲缘关系较近,枇杷属 MYB5 蛋白次之。与模式植物拟南芥 MYB108 蛋白亲缘关系较远。

2.3.2 目的基因的理化特性及信号肽

ProtParam 对 *PbMYB108* 进行理化特性分析发现,*PbMYB108* 的 ORF 为 891 bp,包含 296 个氨基

图3 苹果梨与其他植物 MYB 基因氨基酸序列进化树

酸,蛋白相对分子质量 33219.28,理论等电点(pI)为 6.30,正电荷残基数 28,负电荷残基数 25,分子式为 $C_{1458}H_{2250}N_{410}O_{451}S_{15}$,具有 4584 个原子,不稳定系数 68.96(>40),推测其是不稳定蛋白,总平均亲水性: -0.608。SignalP 分析 PbMYB108 蛋白不具有信号肽。

2.3.3 目的基因的结构域分析

InterPro 结果表明, PbMYB108 蛋白具有 SANT/Myb 结构域,鉴定为 MYB 家族基因。

SMART 分析 PbMYB108 氨基酸序列发现(图 4), PbMYB108 于 14-64 aa 和 67-115 aa 存在两个 SANT 结构域,属于 R2R3- MYB 转录因子,此外,还存在三个低复杂性区域、STAT 蛋白相互作用域、Primase C terminal 1 域、CARD、HOX、FYRC 域。

图4 PbMYB108 结构域

2.3.4 蛋白疏水性和亲水性的分析

采用 ProtScale 软件预测 PbMYB108 蛋白亲/疏水性,其疏水性最大值为 1.278,最小值为 -2.567,均值为 -0.608。数值小于零的为亲水区域,数值大于零的是疏水区域,对于 PbMYB108 氨基酸来看,亲水区的氨基酸占绝大部分,因此 PbMYB108 蛋白属于亲水性蛋白。

2.3.5 目的基因磷酸化分析

利用 Net Phos 2.0 Server 程序对 PbMYB108

蛋白进行磷酸化分析。存在 24 个 Ser, 12 个 Thr, 4 个 Tyr 可能成为蛋白激酶磷酸化位点。

2.3.6 目的基因跨膜结构分析与亚细胞定位

采用 TMHMM Server v. 2.0 分析蛋白序列跨膜结构发现,无明显跨膜区,其受体不在膜上,并定位于细胞核中。

2.3.7 目的基因二级结构预测

SOPMA 软件对氨基酸序列进行二级结构预测发现: PbMYB108 的二级结构主要以 α -螺旋(30.07%), β -转角(6.42%)及不规则盘绕结构(53.72%)和延伸链(9.80%)为结构元件组成。

2.3.8 目的基因的三级结构预测

Swiss-ModelWorkspace 对目的基因自动建模,构建 PbMYB108 蛋白的三级结构(图 5)。三级结构预测可以看到其蛋白含有多个 α -螺旋。

图5 PbMYB108 三级结构预测

3 讨 论

本试验成功克隆苹果梨果皮中 MYB 转录因子家族中 *PbMYB108*, 此基因 ORF 全长为 891 bp, 氨基酸数目 296, 理论等电点 6.30, 为不稳定的亲水蛋白, 定位于细胞核中, 不具有信号肽。受 MYB 结构域数目导致, MYB 转录因子可分为以下 4 种类型: 1R-MYB、R2R3-MYB、R1R2R3-MYB、4R-MYB^[13], 由于 *PbMYB108* 含有 2 个 SANT/Myb 结构域, 故 *PbMYB108* 属于 R2R3 型。同样, 从‘新疆 1 号’苹果克隆获得的 *Ms-xj1MYB10* 也具有 R2R3-MYB 结构域, 研究表明影响花青素合成调控的大多鉴定为 R2R3 型 MYB^[14]。云南红皮梨在果实成熟期, 果实着色逐渐加深, MYB 的含量变化与花青素含量变化具有相关性^[15]。有研究表明, DELLA 可以调控 MYB 的表达^[16]。‘红早酥’中鉴定了 4 个 R2R3 型 MYB 转录因子, 发现 *PbMYB10*、*PbMYB10b*、*PbMYB9*、*PbMYB3* 的表达水平与花青素合成结构基因的表达水平具有很高相关性^[17]。‘金冠’苹果低温诱导后, *MdMYB88* 和 *MdMYB124* 可以促进结构基因 *MdF3H* 和 *MdCHS* 的表达, 从而促进花青素的生成^[18]。‘美早’甜樱桃果实中发现, 随着果实成熟, *PaMYB10* 的表达显著提高^[19]。

近年来也发现有负调节花青素合成的 MYB 家族基因, 苹果中 *MdMYB111* 可以降低 *MdANS* 与 *MdUFGT* 的表达, 进而降低花青素积累^[20]。同样将 *MdMYB32* 过表达处理后, *ANS* 基因的启动被减缓, 从而减弱花青素的生成^[21]。同时也存在由其他基因导致影响 MYB 的转录, 如: 研究发现 *MdHB1* 蛋白可以与 *MdMYB10*、*MdbHLH3*、*MdTTG1* 蛋白于细胞质中结合, 不能激活存在于细胞核中的 *MdDFR* 与 *MdUFGT*, 从而导致花青素的积累减少^[22]。

参考文献:

- [1] 俞 波. 红色砂梨花青苷生物合成相关基因分离及表达研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
- [2] 孙莎莎, 王 楠, 冀晓昊, 等. 红皮梨花青苷调控基因 *PyMYBa* 的克隆与表达分析[J]. 园艺学报, 2014, 41(6): 1183-1190.
- [3] 黄文江, 张绍铃, 肖长城, 等. 早红考密斯及其芽变果实中花青素含量与相关酶活性变化的研究[J]. 西北植物学报, 2011, 31(7): 1428-1433.
- [4] 钱敏杰. DNA 甲基化和 microRNA 调控红梨果皮着色的机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2017.
- [5] Zhu Y F, Su J, Yao G F, et al. Different light-response patterns of coloration and related gene expression in red pears (*Pyrus L.*)[J]. Scientia Horticulturae, 2018, 229:240-251.
- [6] Zhai R, Wang Z, Zhang S, et al. Two MYB transcription factors regulate flavonoid biosynthesis in pear fruit (*Pyrus bretschneideri* Rehd.)[J]. Journal of Experimental Botany, 2016, 67(5): 1275-1284.
- [7] Yang Y N, Yao G F, Zheng D, et al. Expression differences of anthocyanin biosynthesis genes reveal regulation patterns for red pear coloration[J]. Plant Cell Reports, 2015, 34(2): 189-198.
- [8] 孙晓红, 刘源霞, 孙 欣, 等. 红肉苹果果实发育过程中花青苷含量变化及其合成相关基因表达分析[J]. 植物生理学报, 2017, 53(8): 1507-1514.
- [9] 张 波, 曲 东, 杨惠娟, 等. *MdMYB10* 对苹果果皮苯丙氨酸代谢的影响[J]. 园艺学报, 2018, 45(8): 1429-1440.
- [10] 王立新. “澳洲青苹”苹果解袋后果实中花青苷的合成及相关基因的表达调控分析[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2013.
- [11] 张小军. “澳洲青苹”苹果套袋处理后果实着色相关基因的克隆及表达分析[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2013.
- [12] 景晨娟. 套袋对苹果果皮着色的影响及其相关基因表达分析[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2017.
- [13] 冉 昆, 王少敏, 董 放, 等. 杜梨 2 个 MYB 转录因子基因的克隆及序列分析[J]. 果树学报, 2016, 33(S1): 52-58.
- [14] 孙晓红. 红肉苹果 MYB10 及其启动子对花青苷合成相关基因的调控作用[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2017.
- [15] Zhang X, Allan A C, Yi Q, et al. Differential Gene Expression Analysis of Yunnan Red Pear, *Pyrus pyrifolia*, During Fruit Skin Coloration[J]. Plant Molecular Biology Reporter, 2011, 29(2): 305-314.
- [16] 应 震, 周 庄. 植物花青苷代谢调控机理研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2019, 38(3): 75-79, 85.
- [17] 翟 锐. 芽变‘红早酥’梨的花青苷与类黄酮合成机理解析[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2019.
- [18] 谢银鹏. 苹果 *MdMYB88* 和 *MdMYB124* 转录因子在低温和干旱胁迫中的作用机理研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2018.
- [19] 魏海蓉, 宗晓娟, 朱东姿, 等. 甜樱桃 MYB 转录因子基因的克隆与表达分析[J]. 山东农业科学, 2018, 50(3): 6-11.
- [20] 杨官显, 许海峰, 张 静, 等. 苹果花青苷调控基因 *MdMYB111* 的功能鉴定[J]. 园艺学报, 2019, 46(5): 832-840.
- [21] 许海峰, 杨官显, 王意程, 等. 苹果 *MdMYB32* 通过自身 EAR 抑制序列抑制花青苷的生物合成[J]. 中国农业科学, 2018, 51(24): 4690-4699.
- [22] 姜永华. 转录因子 *MdHB1* 调控‘澳洲青苹’苹果花青苷合成的分子机制研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2017.

(责任编辑: 刘洪霞)